

जैव परिदूषण (Biofouling) - एक मुख्य समुद्री समस्या
(ललिता बरगी, प्रेसिला डायस, चेतन गांवकर)
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा- 403004

समुद्री वातावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं, पौदों, शैवाल और अन्य अवयवों के पानी में डुबोए संरचनाओं पर विशेष रूप से जहाजों के पतवार (hull) पर अवांछनीय संचय को जैव परिदूषण कहते हैं। जैव परिदूषण समुद्री जीवों के सतहों पर भी होता है, उसे अपीबायोसीस (epibiosis) के रूप में जाना जाता है। यह विशेषतः उष्मा विनिमयक (heat exchangers), पानी-पाईप ठड़े करने वाले नोदक (propeller), यहाँ तक की गिट्टी पानी (Ballast water) और बिजली स्टेशनों या कारखानों में भी पाया जा सकता है। यह समस्या अधिक उष्णकटिबंधीय पानी में गंभीर है। ठड़े पानी में जैव परिदूषण में केवल बान्धकाल ही कारणीभूत नहीं होते, बल्कि इसमें अन्य अवयव भी शामिल हो सकते हैं।

जैव परिदूषण दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है – सूक्ष्म परिदूषण और स्थूल परिदूषण। सूक्ष्म परिदूषण में सूक्ष्म अवयव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब कि स्थूल अवयव स्थूल परिदूषण के कारक हैं। जैव परिदूषण की यह जटिल प्रक्रिया अक्सर एक जैव परत (biofilm) के उत्पादन के साथ शुरू होती है। जैव परत सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह सूक्ष्म जीव उचित स्थिति में ही जैव परत उत्पन्न करते हैं। पोषक तत्व की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारण है। केवल सूक्ष्म जीव ही नहीं इनके अलावा और अवयव जैसे कि डायटम समुद्री सिवार और अनेक स्त्रावों को भी इसका कारण माना जाता है।

जैव परिदूषण समुदाय :-

परिदूषण अवयवों को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है।


- (अ) सूक्ष्म परिदूषण अवयव
- (ब) स्थूल परिदूषण अवयव

अ. सूक्ष्म परिदूषण अवयव


1. सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव अवपंक (Bacterial slime) :-

सूक्ष्म जीव (बैक्टीरिया) और अनेक जीवकोष, सूक्ष्म जीवाणुओं का एक बड़ा समूह है। आमतौर पर यह लंबाई में कुछ मायकोमीटर होते हैं। ये जीवाणु पृथकी पर हर आवास में सर्वव्यापक हैं। यह सूक्ष्म जीव अवपंक उत्पन्न करते हैं। जो सामान्यतः जैव परत बनाने के लिए उपयोगी होता है।

समस्त समुद्री प्राणीयों का आहार, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पादपल्वकों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि पादपल्वक स्वपोषी होते हैं। पादपल्वकों में डायटम की संख्या सबसे अधिक होती है एवं ये सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। डायटम विभिन्न आकारों, जैसे – वर्तुल, भालाकार, चौकोर, त्रिभुजाकार, दीर्घवृत्तीय, बहुभूजी आदि रूपों में पाए जाते हैं। डायटम की कोशिका, कोष्ठ जैसी सिलिकायम भित्ति में स्थापित होती है। यह कोशिका दो कपाटों में विभाजित होती है। प्रावरक (hypotheca) जो छोटा होता है, अधिप्रावरक (epitheca) से ढंका होता है। डायटम दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक कोशिय जैसे कॉसिनोडिस्कस अथवा श्रृंखलाबद्ध जैसे कीटोसिरोस। उनका पुनरुत्पादन, लैंगिक अथवा अलैंगिक होता है। यह डायटम जैव परिदूषण के प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं।



चित्र 1




चित्र 2

ब. स्थूल परिदूषण अवयव :-

आर्थोपोड

इस वर्ग में कस्टेशियन, मकड़ियां, बिच्छू, सेंटीपीड जैसे समूह शामिल हैं। उनका शरीर एक बहिकंकाल (exoskeleton) से आवरीत होता है। यह बहिकंकाल काइटिन, लिपीड, अन्य प्रोटीन या कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नीचे दिए आर्थोपोड के कुछ मुख्य प्रकार परिदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं।



चित्र 3


1. बार्नाकाल

यह केकड़ों और महाचिंगट से संबंधित है। वे विशेष रूप से समुद्री हैं और उथले (shallow) और ज्वार के पानी में आमतौर पर रहते हैं। बार्नाकाल एनकृस्टर स्थायी रूप से एक कठिन अवस्तर पर खुद को संलग्न करते हैं। ज्यादातर बार्नाकाल निलंबन भरक (suspension feeder) होते हैं।उदा.: बेलेनस बेलेनोयड (Balanus balanoides) बेलेनस एमफीट्रायटे (Balanus amphitrite) बेलेनस टिनटिनेब्यूलम (Balanus tintinnabulum)

2. आयझोपोड और ऐमफीपोड—




चित्र 4



चित्र 5

यह क्रस्टेशियन की दो सफल समूह हैं। दोनों समूहों के सदस्य सक्रीय तैराक नहीं होते और नीचे रिंगक (crawler) और समुद्र तट स्क्रेवेंजर्स के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन दोनों समूहों के सदस्यों में केरापेस की कमी होती है और उनकी बिना डंठल आँखें वृत (stalk) पर नहीं होती। यह दोनों समूह आमतौर पर सभी परिदूषण सतहों पर पाए जाते हैं।


1. डेकापोड



चित्र 6

इस वर्ग में क्रैफिश, केकड़े, महाविंगट, झींगे, चिरांट जैसे कई परिचित समूह शामिल हैं। उनके नाम का तात्पर्य है दस पैर वाले जीव जंतु।


2. समुद्री मकड़ी (Sea spider)



चित्र 7

समुद्री मकड़ी को पेन्टापोडा या पिकनोगोनीड से भी जाना जाता है और यह समुद्री आर्थोपोड है। यह सर्वदर्शीय है, विशेष रूप में भूमध्य और कैरेबियन सागरों, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। समुद्री मकड़ियाँ एक छोटे शरीर के आकार के विपरीत में लंबे पैर के होते हैं। चलने वाले पैर की संख्या आमतौर पर आठ हैं (चार जोड़), लेकिन पांच और छह प्रजातियों के सात जोड़े मौजूद हैं।


3. मृदूकवची (Mollusc)



इस वर्ग में बार्नाकाल के अलावा सब समुद्र किनारों के खोलीदार प्राणी शामिल हैं। मृदूकवची, उच्च और निम्न ज्वार और सभी शेकी समुद्र किनारों की एक प्रमुख विशेषता है। इस वर्ग में पेलेसीपोडस, एमफीन्यूरा, गैस्ट्रोपोडस, सेफेलोपोडस और स्काफोपोडस शामिल हैं। सब में से पेलेसीपोडस, परिदृष्टि में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

6. कूमि (Worms)

ऐनेलिडस (Annelids)




चित्र 9

ऐनेलिडस को सामूहिक रूप से ऐनेलिडा (Annelida) कहा जाता है। इस वर्ग में हिस्सों में बटे कीड़े, मशहूर केंचूआ और जौक (Leech) शामिल हैं। वे सबसे गीले वातावरण में पाए जाते हैं और कई पृथ्वीवासी ताजे पानी में पाए जाते हैं। पोलीकिट्स यह ऐनेलिडस का सबसे बड़ा समूह है और यह ज्यादातर समुद्री हैं।

7. ब्रायोजोआ (Bryozoa)


जलीय ब्रायोजोआ औपनिवेशिक जानवर हैं और वे कैलिश्यम कार्बोनेट के अचिल कंकाल का निर्माण करते हैं। वे कई जानवरों या काई ऐनीमेकुल्स (animacules) या समुद्र मेट (mats) से भी जाने जाते हैं। ब्रायोजोअन आमतौर पर गर्म उष्ण कटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। ब्रायोजोअन की अधिकांश प्रजातियां समुद्री परिवेशों में रहते हैं लेकिन 50 प्रजातियां ताजे पानी में निवास करती हैं।

8. स्पंज (sponges) या पोरिफेरन्स (Poriferans) चित्र 10



स्पंज दुनिया भर में पाए जाते हैं और इसमें 5000 प्रजातियां हैं। हालांकि कुछ समृद्ध ताजे पानी में पाए जाते हैं और अधिकांश स्पंज महासागरों में पाए जाते हैं। कई स्पंज एक विषेला या जहरिला पदार्थ छोड़ते हैं। यह जहर वह अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

9. शूलचर्मी (Echinoderms) चित्र 11



लैटिन में इस नाम का अर्थ है कांटेदार चमड़ी। वे हर महासागर की गहराई में अंतराज्वारीय (Intertidal) क्षेत्र के विनलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ शूलचर्मी उदाहरणतः स्टारफिश दूसरों के लिए मांसभक्षी होते हैं।


10. शैवाल (algae)

यह आमतौर पर स्वपोषित अवयवोंका एक बड़ा और विविध समूह है। इस शैवाल के सबसे बड़े और सबसे जटिल रूप को समुद्री शैवाल (seaweed) कहते हैं। वर्णक रंग के आधार पर शैवाल को नीचे दिये गए मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है।

1. नील-हरित शैवाल (Blue green algae) चित्र 12




2. भूरे रंग के शैवाल (Brown algae) चित्र 13



इस शैवाल को फियोफायसी भी कहा जाता है। यह शैवाल एक बहुत बड़ा समूह है। विश्व भर में 1500–2000 भूरे समुद्री शैवाल की प्रजातियां पाई गई हैं।

3. हरित शैवाल (Green algae) चित्र 14



यह एक बड़ा समूह हैं। जिसमें से उच्च पौधे का निर्माण हुआ हैं। इस हरीत शैवाल वर्ग में कुल मिलाकर 6000 प्रजातियाँ हैं।

जैव परिदूषण नियंत्रण करने के कुछ उपाय:-

1. प्रति परिदूषक रंगों (Paint) का प्रयोग करना।
2. कठोर खोलीदार परिदूषक अवयवों को हथोड़े, चिपरस जैसे औजारों से निकालना।
3. प्रबल पानी के प्रवाह से नर्म परिदूषक अवयवों का निष्कासन करना।
4. जैवनाशी पदार्थों का उपयोग करना जोसे की द्राय व्यूटाईल टिन ऑक्साईड (TBT)।
5. परिदूषक अवयवों पर पलनेवाले परभक्षी अवयवों या जीवों का इस्तेमाल करना।